

- Με βάση την ηχητική ακουνομετρία, επί μονοπλεύρου βαρηκοϊας:

Ελαφρά	Π.Α. 0% (απώλεια ακοής 26 – 40 db)
Μέτρια	Π.Α. 5% - 10% (απώλεια ακοής 41 – 55 db)
Μεγάλη	Π.Α. 10% - 15% (απώλεια ακοής 56 – 70 db)
Υπολειμματική ακοή	Π.Α. 15% - 20% (απώλεια ακοής 71 – 90 db)
Κώφωση	Π.Α. 20% - 25% (απώλεια ακοής άνω του 90 db)

- Επί ετεροπλεύρου βαρηκοϊας ως ακολούθως:

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙΟ	I	II	III	IV	V	VI
I. Φυσιολογική ακοή	0%	0%	5%	10%	20%	25%
II. Ελαφρά βαρηκοϊα	0%	10%	15%	20%	25%	30%
III. Μέτρια βαρηκοϊα	5%	15%	20%	25%	30%	35%
IV. Μεγάλη βαρηκοϊα	10%	20%	25%	30%	40%	45%
V. Υπολειμματική ακοή	20%	25%	30%	40%	50%	60%-70%
VI. Κώφωση	25%	30%	35%	45%	60%-70%	70%-80%

- Σε αμφοτερόπλευρη κώφωση Π.Α. 80%, ανεξαρτήτως από την ανάπτυξη ομιλίας ή όχι
- Η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος δεν αλλάζει το ποσοστό αναπηρίας.

Στις περιπτώσεις μεγάλης βαρηκοϊας, υπολειμματικής ακοής και κώφωσης [στοιχεία Πίνακα IV, V, VI] υποβάλλεται υποχρεωτικά εξέταση «ακουστικών προκλητών δυναμικών» με προσδιορισμό οδού ακοής από 100 – 110 db.

Όταν η ακουστική μελέτη συμπεριλαμβάνει και το ποσοστό διακριτικότητας, προστίθεται στο ποσοστό βαρηκοϊας επιπλέον ποσοστό κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Για διακριτικότητα <40%	Π.Α. +8%
Για διακριτικότητα 40%-60%	Π.Α. +5%
Για διακριτικότητα >60%	Π.Α. +3%
Συχνότερες παθήσεις που συνοδεύουν τη βαρηκοϊα και που πρέπει να εκτιμηθούν στην απόδοση ανικανότητας είναι:	
Με συμμετοχή οργανικών βλαβών	Π.Α. +5%
Συμφυτική ωτίτιδα	Π.Α. +3%
Χρόνια μέση πυώδης ωτίτιδα (ξηρά – πυορροούσα)	Π.Α. +5%-10%
Συγγενείς ανωμαλίες	Π.Α. +15%-60%
Λαβυρινθίτιδα	Π.Α. + 30%
Χρόνια εκκριτική ωτίτιδα	Π.Α. +5%
Κακώσεις λιθοειδούς	Π.Α. + 20%
Βαρότραυμα – περιλεμφικό συρίγγιο (συνήθως επί καταδύσεων)	Π.Α. + 40%